

Nr. 348 / data. 23.04.2025

OFICIUL FITOSANITAR GORJ, Str. Ecaterina Teodorescu, nr. 521, Targu Jiu,
judetul Gorj, Tel: 0253.249.043, Email: ofgorj@anf.ro

Catre:

PRIMARII-toate

In atentie: Doamnei/Domnului Primar/Compartimentul Agricol-Pentru informarea utilizatorilor de produse de protectia plantelor

Ref: Informare privind sistemul de instruire si certificare in scopul utilizarii durabile a produselor de protectia plantelor

Potrivit prevederilor art13 din Ord. ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale ,ministrul mediului si ministrului sanatatii nr.1356 /1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire si certificare in scopul Utilizarii durabile a produselor de protectia plantelor.

Toate persoanele care desfasoara activitati cu produse de protectia plantelor au obligatia de a urma cursul de instruire in vederea obtinerii certificatului de formare profesionala.

Persoanele care doresc sa se inscrie la cursul de formare dedicat utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor si consilierilor pot accesa urmatorul link: <https://fits.anfd.ro>

Cum sa accesati platforma FITS:

1. Inregistrare: Accesati site-ul oficial al platformei FITS la <https://fits.anfd.ro> si creati cont un personal.
2. Veti primi un mail de activare cont (verificati in mesaje primite sau in spam)
Mail va fi valabil doar 15 minute.
3. Activati contul cu CNP si parola aleasa., iar apoi urmati pasii-completati toate datele personale, incarcati copie Ci si copie act de studii absolvite.
4. Veti primi factura in valoare de 193 lei pentru curs. Dupa efectuarea platii incarcati dovada de plata
5. Selectarea cursului: alegerea cursului corespunzator rolului dumneavoastra (utilizator profesionist, distribuitor, consilier)
6. Participarea la curs: parcurgeti modulele de instruire (3 zile) iar a 4 a zi este testarea. Cursul trebuie accesat doar din contul dumneavoastra de pe platforma FITS, pentru a putea fi inregistrata prezenta la curs.
7. Obtinerea certificatului: Dupa finalizarea cu succes a cursului si promovarea testului final (min. 70 puncte obtinute), veti putea descarca certificatul de formare profesionala din contul dumneavoastra de cursant de pe platforma FITS

Pentru detalii suplimentare puteti contacta Oficiul Fitosanitar GORJ.

Telefoane utile: 0730923876-UNGUREANU C-tina, 0787602706-CROITORU DORIN sau 0253249043

Oficiul fitosanitar Gorj

CROITORU DORIN CATALIN



UNGUREANU C-TINA

Nr. 316/ data 14.04.2025

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr .11 din 14.04.2025

,, A preveni este mai simplu decat a vindeca''

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea buruienilor, bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante la următoarele culturi de cereale paioase:

GRAU, ORZ, ORZOACA, OVAZ SI TRITICALE

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: infestarea culturii cu buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene, boli foliare. Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele de protecție a plantelor -erbicide, după caz:

- DICOPUR TOP 464 SL (CEREDIN FORTE 464 SL) = 0,8 - 1 l/ha sau
- DICOPUR M = 1 l/ha sau
- ATLANTIS FLEX = 0,2 l/ha - 0,33 l/ha (în funcție de gradul de îmburuienare și buruienile rezistente-iarba vântului, odos, coada vulpii, mușetel se va da doza maximă) sau
- GRANSTAR SUPER 50 SG (CAMEO MAX) = 40 g/ha când e deficit hidric se aplică adjuvant TREND în doza 250 ml/ha se aplică de la înfrățit până la apariția frunzei stindard iar apa se va folosi 500 l/ha) sau
- HELMSTAR 75 WG (TRIMEO) = 10-20 g/ha (15-20 g/ha la grau, triticale- și 10-15 g/ha la orz)

Dacă în cultura și-au făcut apariția bolile foliare (fainare, rugini, fuzarioza complexul de daunatori (mustele cerealelor și paduchele verde al cerealelor) atunci concomitent cu erbicidatul puteți aplica pentru infecția primară la boli și prezenta daunătorilor următoarele amestecuri:

- KING 250 EW = 0,5 L/HA + DELTAGRI = 0,3 L/HA sau
- NATIVO 300SC (TWIST PLUS) = 0,8 L/HA + CYCLONE (FASTER GOLD 50 EC) = 0,1 L/HA sau
- FALCONE PRO (IMPULSE PRO 425 EC) = 0,6 l/HA + REXARIS 25 WG = 0,3 KG/HA

Perioada optimă de tratament: înfrățire paioaselor până la formarea primului internod și altele până la apariția frunzei stindard iar palamida să nu depășească 10-15 cm înălțime.
Cantitatea de apă folosită la hectar variază între 200-400 l.

***SE VA RESPECTA CU STRICTETE PERIOADA DE ERBICIDARE RECOMANDATA A PRODUSULUI FOLOSIT.**

Se vor folosi numai produse de protecția plantelor omologate.

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe: <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html> - <https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA-guest și dați cautare în PEST-EXPERT.. Folosiți echipament de protecție (halat, ochelari, manși, manși) la manuirea produselor de protecția plantelor.

Nu deversați soluțiile de stropit pe sol, lângă cursuri de apă, canale de scurgere, suprafețe de beton. Aplicați tratamentul în condiții favorabile fără vânt și ploi cu temperaturi pozitive peste 8-10 grade Celsius.. Clătiți de 3 ori recipientele și livrați ambalajele la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora <program SCAPA> accesați www.aiprom.ro.

. Luați măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și siguranță în muncă. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „Ghidului de bune practici

de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>. "Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu, clima, sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala masurile (M10, M11, M13, M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, Ord. nr. 68/1992 al M. Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016 ` privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C.;A.F; I.I)-----

Sediul(adresa)-----

Ferma-----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuarii tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Si locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltarii produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitate Utilizate (kg, l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67(1))

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii .

COORDONATOR
CROITORU Dorin Catalin



INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA

Nr .320 / data 14.04.2025

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 12. din 14. 04. 2025



„ A preveni este mai simplu decat a vindeca ”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SAMBUROASE (PIERSIC, CAIS, CIRES ,VISIN)

Boli : monilioza produsa de ag.patogen (-Monilinia spp).,ciuruirea produsa de agentul patogen - (Coryneum b).,patarea rosie produsa de agentul patogen(-Polystigma rubrum),basicarea frunzelor de piersic produsa de agentul patogen(-Taphrina deformans)
Daunatori : viespea prunelor (Hoplocampa spp.),omizi defoliatoare-cotarul brun(Operopthera brumata)si cotarul verde (Erannis defoliaria)

Pentru prevenire si combatere se recomanda se recomanda executarea tratamentului I la Hoplocampa spp.dupa criteriul biologi in perioada preovipozitara (depunerea primelor oua la baza caliciului floral) numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii :

-boli infectie secundara si prezenta daunatorilor

Se recomanda folosirea unuia din produsele sau amestecurile de mai jos :

- SIGNUM (SYREX STAR) =0,5 KG/HA + DECIS 25 WG= 0,003KG/HA sau
- MERPAN 80 WDG (FLO-CAPTAN a doua den .com + MAVRIK 2F =0,05%(0,5 l/ha in 1000 l apa) sau
- SCORE 250 EC = 0,2L-0,3 L/ha (Mavita a doua den com) + DELTAGRI(FASTER DELTA) =0, 25-0.3l/ha sau
- KANTAREL = 0,3-0,4 l/ha + KARATE ZEON =0.15%

Perioada optima de tratament: dupa criteriul fenologic atunci cand 15 % din petale s-au scuturat iar tratamentul al II lea la 8-10 zile de la primul tratament. Avand in vedere faptul ca pana la completa dezvoltare larva migreaza in 2-3 fructe si de aceea e necesar tratamentul al II lea.

Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare . Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar:html-https://aloe.anfdf.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manipularea produselor de protectia plantelor.

Nu deversati solutiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de beton.Cantitatea de solutie la ha este de 1000 litriși aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploi.Clatiti de 3 ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea

acestora <program SCAPA >accesati www.aiprom.ro.. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa. respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatare agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu,clima ,sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala masurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,ORDINUL297 MADR/2007,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitară și Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016 ` privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Attentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

FERMIER(S.C.;I.I.;A.F.) -----

Sediul(adresa)

Ferma-----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CUN PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultur a și locul unde este situat terenu l	Timpul aplicari i	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsa- bile de efect. tratament. Semnatura	Data incepe rii Recolt arii produs ului agricol	Nr. si Data Documen tului prin care s-a dat in consum populație i
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denu- mirea Ppp folosi t	Doza Omo- logat a /doza folo- sita	Su- pra - fat a (ha)	Cantit . Utili- zate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și stampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F.GORJ
CROITORU DORIN CATALIN



INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA

NR. 321./ data 14.04.2025

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 13 din 14.04.2025

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SEMINTOASE(MAR,PAR,GUTUI)

Boli:rapan(*Venturia* spp.),fainare (*Podosphaera* spp.,monilioza (*Monilinia* spp.),patarea alba a frunzelor (*Mycosphaerella* spp.)

Daunatori :viespea merelor (*Hoplocampa* spp.) omizi defoliatoare-cotarul verde și brun (*Operopthera* b.și *Erannis defoliaria*),afide (*Aphis* spp.),inelarul (*Malacosoma neustria*),psilide (*Psylla* spp.) și acarieni.

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului -I - la *Hoplocampa* spp. după criteriul biologic în perioada preovipozitară (depunerea primelor ouă la baza caliciului floral) numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

-boli infecție secundară

- prezenta daunatorilor

Se recomandă folosirea unui din produsele de protecția plantelor sau amestecurile de ppp. de mai jos:

- CUPROFIX ULTRA(NOVICURE)=0,75-1,25KG/HA + LASER 240 SC=0,6 L/ha sau
-LUNA EXPERIENCE 400 SC =0,75 L/ha + DELTAGRI =0,375%-0,45 l/ha sau
-SWITCH 62,5=0,8 -1 KG /HA + MAVRIK 2F = 0,05 % sau
-KUMULUS DF =0,3% +FOLPAN 80 WDG =0,15 % +DECIS 25 WG =0,045Kg/ha(0,003%)

Când sunt găsiți ca densitate de 4-5 acarieni /frunza sau 7-10 acarieni pe inflorescență și peste ac. densitate atunci se folosește un acaricid :

MILBECKNOK =0,05 % sau sau NISSORUN 10 WP =1 kg/ha sau ORTUS 5 SC 1 L/HA sau

Perioada optimă de tratament după criteriul fenologic atunci când 10-15% din petale s-au scuturat iar tratamentul al-II -lea la viespe se execută la 8-10- zile.de la tratamentul I .

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați cautare în PEST-EXPERT..Folosiți echipament de protecție (halat,ochelari,manusi) la manuirea produselor de protecția plantelor.

. Luați măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă. Sa. respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „ Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, Referințe:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa păstrați o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a ppp. depozitate și utilizate în exploatare.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agenției Naționale Fitosanitare și Asociația Crescătorilor de Albine din România,

privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după următorul model:
FERMIER(SC;II;AF).....
SEDIUL-----
ADRESA FERMEI-----

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabil de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg, l.)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67(1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR
CROITORU DORIN CATALIN

[Signature]



INTOCMIT
UNGUREANU CTINA

[Signature]