

NR. 95 /12.02.2026

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.3 data 12.02.2026

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare în perioada repausului vegetativ ,cand conditiile meteorologice sunt prielnice : temperatura peste 5 grade Celsius,zile insorite ,fara vant,scoarta pomilor,arbustilor(fructiferi sau ornamentali) a speciilor pomicole și dendrologice din pepiniere trebuie sa fie uscata, fara chiciura și gheata se recomanda un tratament fitosanitar la urmatoarele grupe de plante sau culturi :

**POMI FRUCTIFERI (SEMINTOASE –SAMBURIOASE,ARBUSTI,
PEPINIERE POMICOLE SI DENDROLOGICE ,VITA DE VIE)**

Pentru prevenirea și combaterea daunatorilor din rezerva biologică :paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus),paduchele testos (Parthenolecanium corni),oua de afide (Aphis spp.),acarieni (Tetranychus și Panonychus ulmi),paduchele lanos (Eriosoma lanigerum) ,psylide se recomanda executarea tratamentului numai pe parcelele pe care a fost confirmata prezenta acestora.Imediat dupa efectuarea lucrarilor de taiere (rarire și fructificare) se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar prin imbaierea foarte buna a pomilor ,arbustilor și speciilor din pepiniere.

Pentru focul bacterian al rozaceelor boala produsa de ag.patogen (Erwinia amylovora)se face taierea ramurilor cu simptom la circa 50 cm sub limita prezentei simptomelor,iar intregul material vegetal va fi strans și distrus prin ardere.Unelte de lucru (foarfeci ,fierastrau)vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare cu solutie cuprica 3% sau hipoclorit de sodiu conc.1%

Ulceratiile de pe trunchi vor fi inlaturate inclusiv o parte de 2 cm din tesutul ce inconjoara ulceratia și rana se dezinfecteaza cu 1% oxicleorura de cupru- lucrare ce se face inainte de taierea propriu-zisa din livada pentru a se evita raspandirea infectiei la alte specii din jur.Se recomanda folosirea unuia din produsele de mai jos:

1) Tratament cu produse pe baza cuprice(stropirea albastra):

*CUPROFIX ULTRA (NOVICURE a doua denumire comerciala)=6 kg/ha/la samburioase și 3,5-6 kg/ha la semintoase

*BOUILLIE BORDELAISE WDG(BORDO MIX a doua denumire comerciala) = 0,5%

(5kg/ha samburioase și alte specii la 1000 litri apa și 7,5kg/ha la semintoase / 1500 litri apa) sau

* ALCUPRAL 50 PU =0,2% (2kg/ha/1000 L apa) și 0,3% semintoase(4,5 kg/ha/1500 l apa

2) Tratamentul se aplica la 12-14 zile de la cel cu produse cuprice:

*MOSPILAN 20 SP(KRIMA 20 SC a doua denumire)=0,450kg/ha + TOIL =0.5% adjuvant pe baza de ulei sau

*PLANTOIL(MIDOS OIL a doua denumire comerciala=0,75-1%(3,75-15 l/ha)

*OVIPRON TOP(VERNOIL a doua denumire comerciala) =2500ml/100 litri apa sau 1500 ml /100litri apa in amestec cu insecticide sau

* JUVINAL 10EC =0.1% sau

Puteti folosi și alte produse pentru protectia plantelor omologate,peu a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice ;fizice; biologice;

Metode durabile; biologice,fizice,mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice,daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Verificati,cu mare atentie,recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Iuati masurile ce se impu pentru protectia mediului inconjurator!

Se pot utiliza și alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :http://www.madr.ro/ro /fitosanitar.html-https:

/aloe.anfd.ro, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA guest și dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor.

Sa pastrati o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate și utilizate in exploatare. Nu deversati solutiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de beton.Cantitatea de solutie la ha

este de 1000 litri si aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploaie. Clarificati de 3 ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea acestora <program SCAPA >accesati www.aprom.ro.

Fermierul trebuie sa anunte Primaria si pe toti crescatorii de albine pe o raza de 3 km de locul unde se executa tratamentul si perioada cand se executa.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.(5b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R- Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind

implementarea Agenției Naționale Fitosanitare și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp.

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după urmatorul model:

FERMIER (S.C., I.L.A.F.)-----

Sediul(adresa)-----

Ferma(sediul)-----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în cunoscanță populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folo-sita	Suprafata (ha)	Cantitate Utilizate (kg, l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR
Cons.sup.CROITORU DORIN CATALIN

Intocmit
Cons.sup.UNGUREANU CONSTANTINA




NR. 64 /0/02.02.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 2 din 02.02.2026

Condițiile climatice din ultimele zile cat si cele de microclimat din spațiile protejate (sere, solarii) pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor :fainare (Oidium spp.), rugina (Uromyces spp.), putregaiul cenușiu (Botrytis spp.) și daunătorilor: paduchii verzi (Macrosiphum rosae), paianjenul roșu (Tetranychus urticae), musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) care pot cauza pierderi importante la următoarele specii de plante ornamentale:

FLORI LA GHIVECE

(PRIMULE, MUSCATE, ZAMBILE, BEGONIA, LALELE, TRANDAFIRI, CRIZANTEME)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului fitosanitar în spații protejate numai când s-au îndeplinit următoarele condiții :

-prezența daunătorilor și infecție primară la boli

Folositi unul din amestecurile de produse de protecția plantelor de mai jos recomandate în codexul PEST-EXPERT, omologate pentru agenții de daunare enumerați mai sus :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) AIRONE SC=2.78 l/ha | + SHERPA 100 EC (CYPERFOR 100 EC) = 0,3 l/ha sau |
| 2) COPRANTOL DUO =2,7 KG /HA | + MOSPILAN 20 SP (GAZELLE)=0,0125% sau |
| 3) CUPROFIX ULTRA =2,5-4 kg/ha | + POLECI(DECA 2,5 EC) =50 ml/hl apa(0.05 %) sau |
| 4) POL-SULFUR 800 SC=225 ML/HL | + MAVRIK 2F = 0,04 % (0,4 l la 1000 l apa) sau |
| 5) OMIX(EDEGAL) =10 ml /mp | + SANMITE 10 SC (NEXTER A DOUA DEN) = 1.4 l/ha sau |

Aplicarea tratamentului : preventiv și la apariția infecției cu agenți de daunare .

Tratamentele II, III, IV se vor repeta în funcție de evoluția bolilor și daunătorilor la intervale de 8-10 zile .Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se regăsesc în codexul PEST-EXPERT și cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.

Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA-guest si dati cautare în PEST-EXPERT..Folositi echipament de protecție (halat, ochelari, manusi, manusi) la manipularea produselor de protecția plantelor. . Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Luati masuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă. Sa. respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, Referințe:<http://www.madr.ro/> norme -de- eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html."

Sa pastrati o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a ppp. depozitate și utilizate în exploatare. 9FACTURI,

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din

România, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/ 21.10.2016 încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din

România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.

Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după urmatorul model:

Numele si prenume fermier(S.C.,A.F.,I.L.)

Domiciliul fermier-----

Ferma (sediul)-----

REGISTRUL DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua, luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume Prenume pers. responsa- bile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documen- tului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denu- mirea Ppp folosit	Doza Omo- logata /doza reolo- sita	Supra- rata (ha)	Cantit. Utili- zate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) a fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F.GORJ

Cons.sup. CROITORU DORIN



INTOCMIT

Cons.sup. UNGUREANU C-TINA



Nr. 28 / O / 20.01.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 1 din 20.01.2026

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca ”

Pentru prevenirea si raspandirea organismelor daunatoare agenti patogeni de sol si daunatori de sol in cultura :

SPATII PROTEJATE (SERE SI SOLARII) PENTRU PRODUCEREA RASADURILOR DE LEGUME, LEGUME TIMPURI

1) Dezinfectia amestecului de pamant pentru producerea rasadului :

Pentru combaterea ciperilor de sol ,inainte de semanat cu 5-7 zile amestecul de pamant se va dezinfecta cu unul din produsele : PREVICUR ENERGY = 0,1 % (3 litri solutie /mp) sau TRIUMPH 40 WG =0,3 %. Se poate dezinfecta termic amestecul de pamant cu vapori de apa supraincalziti timp de o ora la 95-100 grade C la adancime 30-35 cm daunatorii mor instant.


2) Tratarea chimica a semintei : PREVICUR ENERGY 2 ml/kg samanta.

3) Dezinfectia solului si a substratului de cultura destinat culturii de legume timpurii in spatii inchise

3) Tratatment in vegetatie dupa rasarirea plantulelor pana la repicare pentru combaterea complexului de agenti patogeni de rasarire : putrezirea plantulelor (*Pythium debaryanum*), mana de sol (*Phytophthora parasitica*), putregaiul uscat al coletului (*Rhizoctonia solani*)



Pythium de barianum



Phytophthora parasitica

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu ppp: PREVICUR ENERGY =0,1 % sau sau MERPAN 80 WDG =0,15% (4-5 l solutie /mp (FLO-CAPTAN a doua denumire comerciala) sau

4) Dezinfectia solului inainte de transplantarea rasadurilor in camp sau in spatii protejate pentru complexul de patogeni de sol: mana de sol (*Phytophthora parasitica*), putregaiul uscat al coletului (*Rhizoctonia solani*), fuzarioza tomatelor (*Fusarium spp.*), caderea plantutelor (*Pythium debaryanum*), nematozii galicoli, se va folosi unul din produsele:

1) OMIX (EDEGAL) = 300 ml /m³ /substrat se aplica prin incorporare in sol, inainte de insamantare volum de apa 10-20 l/m³/sol/substrat

2) RAISAN 51 = 700 L/ha aplicat prin udare inainte de plantare sau semanat

3) NEMASOL 510 (fumigant de sol cu actiune nematocida ,fungicida ,erbicida ,insecticida =700-1200 l/ha (0,07-0,120 l/ mp)

Tratatmentului solului ,in sistem de irigare cu picatura se va efectua ,cand in sol se inregistreaza o temperatura de 15 grade ,cu cel putin 21 de zile inainte de plantarea rasadului.

Pentru reducerea rezervei biologice de :musculita alba de sera (*Trialeurodes vaporariorum*), tripsul tutunului (*Thrips tabaci*), musca miniera (*Lirymiza trifolii*) omida capsulelor (*Helicoverpa armigera*) si alte insecte se recomanda aplicarea unuia din produsele :

sau MOSPILAN 20 SP =0,025 % (GAZELLE a doua denumire comerciala) sau DELTAGRI =0,4 l/ha

5) Pentru combaterea coropisnitei (*Gryllotalpa gryllotalpa*) si a melcilor fara cochilie :