

NR. 400 data 11.05.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 24 din 11. 05. 2026

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”


Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile :

CIRES SI VISIN

Boli : monilioza (*Monilinia laxa*), ciuruire (*Coryneum beijerinchi* sau *Stigmina carpophilla*), patarea frunzelor de cires (*Blumeriella jaapii* sau *Cocomices hiemalis*)
Daunatori : musca cireselor sau viermele cireselor (*Rhagoletis cerasi*), afide



COCOMICES HIEMALIS



Musca cireselor (*Rhagoletis cerasi*)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție secundară
- prezența daunătorilor

Folosiți una din combinațiile de mai jos după caz :

TELDOR 500 =0,08% (0,8 litri/ha + DELTAGRI =0,25- 0,3L/HA sau

BOUILLE BORDELAISE WDG = 0,5 % (5 kg/ha) +LASER 240 SC(NEXSUBA) =0,06 % sau

SCORE 250EC(MAVITA 250 EC)= 0,2 l/ha + MAVRIK 2F ==0,05%(0,5 L la 1000 l apa)

Perioada optimă de tratament :- tratamentul I imediat

-tratamentul II se va repeta la 8-9 zile de la primul ,perioada ce coincide cu maximul curbei de zbor al adulților de *Rhagoletis*.

S e mai pot folosi capcane cu feromon; tip. ATRA CERAS(panou galben cu feromon)

Aplicati tratamentul imediat cand sunt conditii favorabile de temperatura, fara ploi,zile calme fara vant pentru a reduce la minim riscul de a ajunge solutia pe culturile din jur. Consiliile locale ,fermierii sau administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie sa anunte in scris sau telefonic

apicultorii care au vatra de stupina stationara/ permanenta sau temporara/pastorala inaintea efectuării tratamentelor fitosanitare cu cel puțin 24 de ore.

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor înainte de utilizare

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar:html>-<https://aloe.anfdf.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)

la manipularea produselor de protectia plantelor

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform

„ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp, elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp, depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină:

Nume si prenume fermier/Societate comerciala/ii-----

Domiciliul fermier/Sediul societatii-----

Ferma(adresa)-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare după urmatorul model:

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume. Prenume pers. responsabila de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosi	Doza logata /doza folo-sita	Su-ora. fat (ha	Can- tate Utili- zate (kg,l			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtând semnatura si data. După caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR
Cons sup. CROITORU DORIN CATALIN



INTOCMIT
Cons.sup. UNGUREANU C-TINA

NR.406 data 12.05.2026

BULETIN DE AVERTIZARE
NR.25 data 12.05.2026

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante la speciile pomicele :

CAIS,PIERSIC,NECTARIN

Daunatori: Molia orientala a fructelor (Grapholita molesta,Molia vărgată a piersicului (Anarsia lineatela),afide (Aphis spp)

Boli: Băsicarea frunzelor (Taphrina deformans) ,Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila),Monilioza spp.,Făinarea (Sphaerotheca pannosa var persicae)



Basicarea frunzelor

ciuruirea frunzelor

Atac Grapholita molesta

-Molia orientala a fructelor (Grapholita molesta)-generatia I -Larva acestui daunator ataca lastarii si fructele de piersic

-Molia vargata a piersicului (Anarsia lineatela) are trei generatii pe an si ierneaza pe tulpini si ramuri in crapaturile scoarte,larvele isi incep activitatea primavara devreme cand ataca atat lastarii tineri cat si fructele in formare.Boli infectie din rezerva biologica. Pentru prevenire si combatere se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar cu unul dintre amestecurile insecticide + fungicide:

1. CORAGEN (VOLIAM a doua denumire com.) = 175 ML /HA + SCORE 250 EC =0,15 -0,2 l/ha sau
2. AFFIRM OPTI = 2,5 KG/HA + AIRONE = 3,5 L/HA (piersic si nectarin) - 4 l/ha (cais) sau
3. DELEGATE=0,3 KG/HA + LUNA EXPERIENCE 400 SC=05 L/HA

La efectuarea tratamentului fitosanitar se mai pot utiliza si alte produse de protectia plantelor, omologate in Romania.Lastarii atacati trebuie taiati si eliminati .Virful ramurilor atacate prezinta clei (exudat gomos).

Perioada optima pentru efectuarea tratamentului :

- la primirea avertizarii

Puteti folosi si alte produse pentru protectia plantelor omologate,peptu a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere:mecanice,fizice, biologice;

Metode durabile;biologice,fizice,mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice,daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizati. Referințe: <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar:html> - <https://aloe.anfd.ro>, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați cautare în PEST-EXPERT. Folosiți echipament de protecție (halat, ochelari, manusi, manusi) la manipulearea produselor de protecția plantelor.

Sa pastrati o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate și utilizate în exploatare.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 58/1992 al M. Mediului, nr. 15b/3404/1991 al

Departamentului pentru Administrație Locală, nr. 17&6/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.0.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIS (NR. 103/21.10.2016 privind

implementarea Agenției Naționale Fitosanitare și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemei și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Atenționare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după următorul model:

FERMIER (S.C., I.I., A.F.)-----
Sediul(adresa) -----
Ferma(sediul) -----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENȚA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat				Nume, Prenume, Pers. responsabilă de efectuarea tratamentului	Data începerii Recoltării	Nr. și Data Documentului primăriei care a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boti/ Daunatori/ buruienii	Denumirea ppp: roșos	Doza omologată: doza folosită	Sursele (na): (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67(1))

Producătorului agricol numerotează paginile registrului. La fiecare înregistrare (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, în cazul fermierului sau administratorului societății).

COORDONATOR
Cons. sup. CROITORU DORIN CATALIN



Intocmit
CONS. SUP. UNGUREANU CONSTANTINA